

Tabella riassuntiva Circolare MdS 11/07/2022 “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”

Tabella di riferimento per intervalli tra vaccinazioni e infezione dai 60 anni e per i soggetti fragili (12-59 anni) **

1° evento	Intervallo tra 1° e 2° evento	2° evento	3° evento	4° evento	5° evento
1° dose vaccino	Intervallo del vaccino utilizzato	2° dose vaccino	1°Booster dopo almeno 120 giorni da 2° evento	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 3° evento	Non previsto
Infezione	3-11 mesi (possibilmente entro i 6 mesi)	1° dose vaccino ^ °°	1° Booster dopo almeno 120 giorni da 2° evento	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 3° evento	Non previsto
Infezione	≥ 12 mesi	1° dose vaccino oltre 12 mesi da 1° evento	2° dose a 21-28 giorni (a seconda del vaccino) da 2° evento	1° Booster dopo almeno 120 giorni da 3° evento	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 4° evento
1° dose vaccino	≥ 14 giorni	Infezione^	1° Booster dopo almeno 120 giorni da 2° evento	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 3° evento	Non previsto
1° dose vaccino	< 14 giorni	Infezione^	2° dose da recuperare il prima possibile entro 6 mesi da 2° evento °°	1° Booster dopo almeno 120 giorni da 3° evento	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 4° evento
1° dose vaccino	Intervallo del vaccino utilizzato	2° dose vaccino	Infezione^	1° Booster dopo almeno 120 giorni da 3° evento	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 4° evento
Una qualunque delle situazioni precedenti			1°Booster dopo almeno 120 giorni da ultimo evento	infezione	2°Booster dopo almeno 120 giorni da 4° evento

New!

°° l’intervallo minimo consigliato è di 3 mesi.

^ intervallo conteggiato a partire dal 1° tampone positivo

**per le condizioni di fragilità di riferimento è la tabella 1 dell’Allegato 2 della circolare 11/07/2022 “estensione platea second booster”

ATTENZIONE: l’ultimo caso è stato inserito con la circolare 0032264-11/07/2022-DGPRES-DGPRES-P “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.”